

衢州第二人民医院-重症系统 - 功能 #643

当子医嘱或主医嘱数值有小于50ml时，取数值大的一方（比如主医嘱10，子医嘱200，取200ml作为入量）  
当数值都大于等于50ml时，做相加为入量数值（比如主医嘱100，子医嘱200，入量为300总量）  
子医嘱作为白蛋白时，将他以10g=50ml的换算比例，加入主医嘱的用量（如主医嘱100ml 子医嘱白蛋白10g  
取总入量为150ml）泵与口服鼻饲不作为pda同步入量，由咱们自己进行录入统计

2023-12-01 11:12 - 运徐

状态:	已解决	开始日期:	2023-12-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	靳乐 靳	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b> 当子医嘱或主医嘱数值有小于50ml时，取数值大的一方（比如主医嘱10，子医嘱200，取200ml作为入量） 当数值都大于等于50ml时，做相加为入量数值（比如主医嘱100，子医嘱200，入量为300总量） 子医嘱作为白蛋白时，将他以10g=50ml的换算比例，加入主医嘱的用量（如主医嘱100ml 子医嘱白蛋白10g 取总入量为150ml） 泵与口服鼻饲不作为pda同步入量，由咱们自己进行录入统计 单位基本换算g=ml 1kg=1000ml mg=0.001ml U=0.05ml ug=0.001mg=0.000001ml			

历史记录

#1 - 2024-02-18 15:29 - 靳乐 靳

- 状态从 新建 变更为 已解决